



**Ulotka informacyjna o składniku krwi
przeznaczonym do użytku klinicznego
UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT
KRWINEK CZERWONYCH DO
TRANSFUZJI DOPŁODOWEJ**

**F-EX-8.2.1-01
Wydanie 1 z
22.11.2018**

<u>Rodzaj płynu konserwującego lub wzbogacającego</u> CPDA-1
<u>Warunki transportu</u> Transportować w warunkach poddanych walidacji w temperaturze nie przekraczającej 10°C, najlepiej w specjalnych samochodach chłodniach lub w zwykłych samochodach wyposażonych w transportową lodówkę zasilaną elektrycznie albo w kontener z izolacją wypełniony wkładami chłodzącymi. Składnik nie powinien być transportowany w temperaturze nie przekraczającej 10°C dłużej niż 24 godziny.
<u>Przechowywanie i termin ważności</u> Przechowywać w temperaturze 4° C . Termin ważności składnika napromieniowanego 24 godziny.
<u>Wskazówki dotyczące przetaczania</u> 1. Przetaczać natychmiast po otrzymaniu 2. Nie przetaczać w przypadku stwierdzenia hemolizy, innych zmian wizualnych lub uszkodzenia pojemnika. 3. Przetaczać przez filtr 170-200µm.
<u>Wskazania do stosowania</u> 1. Znacznego stopnia niedokrwistość płodu.
<u>Środki ostrożności podczas stosowania</u> 1. Kontrolować szybkość transfuzji aby uniknąć gwałtownych zmian objętości krwi.
<u>Możliwe niepożądane reakcje występujące u matki</u> 1. Hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe. 2. Niehemolityczne reakcje poprzetoczeniowe (głównie dreszcze, gorączka), 3. Reakcje anafilaktyczne. 4. Alloimmunizacja, w szczególności antygenami HLA i krwinek czerwonych 5. Przeniesienie zakażenia kiłą – może nastąpić, jeśli zakażony składnik przed przetoczeniem był przechowywany w temperaturze 4°C krócej, niż 96 godzin. 6. Przeniesienie zakażenia wirusowego (np. HCV, HIV itp.) - jest możliwe, pomimo starannej selekcji dawców i wykonywania badań przesiewowych. 7. Przeniesienie zarażenia pierwotniakami (np. zarodźcem malarii) – bardzo rzadko. 8. Posocznica spowodowana zakażeniem bakteryjnym składnika. 9. Zaburzenia biochemiczne (np. hiperkaliemia) – po masywnych przetoczeniach. 10. Poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa (PTP). 11. Poprzetoczeniowa choroba przeszczep przeciwko biorcy (TA-GvHD). 12. Ostra poprzetoczeniowa niewydolność oddechowa (TRALI). 13. Przeniesienie zakażenia innymi czynnikami zakaźnymi, które nie są badane lub rozpoznane.
<u>Dodatkowo w przypadku płodu występuje następujące zagrożenie</u> 1. Przeciążenie krążenia. 2. Przeniesienie wirusa cytomegalii 3. Zatrucie cytrynianem 4. Zaburzenia biochemiczne (np. hiperkaliemia)