



**Ulotka informacyjna o składniku krwi
przeznaczonym do użytku klinicznego
UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT
KRWINEK PŁYTKOWYCH DO
TRANSFUZJI DOPLODOWEJ**

**F-EX-8.2.1-01
Wydanie 1 z
22.11.2018**

<u>Rodzaj płynu konserwującego lub wzbogacającego</u> CPDA-1
<u>Warunki transportu</u> Transportować w warunkach poddanych walidacji w pojemniku z izolacją w temperaturze od 20°C do 24°C. Na 30 minut przed użyciem pojemnik transportowy należy otworzyć i pozostawić w temperaturze pokojowej. Nie należy przekraczać 24 godzinnego transportu bez wytrząsania.
<u>Przechowywanie i termin ważności</u> 1. Przechowywać w temperaturze od 20°C do 24°C, stale mieszając . 2. Termin ważności w pojemnikach „oddychających” wynosi do 5 dni, 3. Po napromienieniu składnik zachowuje ważność przez 6 godzin 4. Składnik powinien być przygotowany po pobraniu tak szybko jak to jest możliwe i użyty w ciągu 6 godzin od procedury zagęszczenia.
<u>Wskazówki dotyczące przetaczania</u> 1. Przetaczać natychmiast po otrzymaniu.
<u>Wskazania do stosowania</u> 1. Znacznego stopnia małopłytkowość, która może być spowodowana alloimmunizacją płodu.
<u>Środki ostrożności podczas stosowania</u> 1. Aby uniknąć gwałtownych zmian objętości krwi, kontrolować szybkość transfuzji 2. Kontrolować możliwość krwawienia z miejsca wkłucia
<u>Możliwe niepożądane reakcje występujące u matki</u> 1. Niehemolityczne reakcje poprzetoczeniowe (głównie dreszcze, gorączka), 2. Reakcje alergiczne i anafilaktyczne. 3. Alloimmunizacja, w szczególności antygenami HLA i HPA. 4. Zatrucie cytrynianem (u chorych z zaburzeniami czynności wątroby) 5. Przeniesienie zakażenia kiłą. 6. Przeniesienie zakażenia wirusowego (np. HCV, HIV itp.) - jest możliwe, pomimo starannej selekcji dawców i wykonywania badań przesiewowych. 7. Przeniesienie zarażenia pierwotniakami (np. zarodźcem malarii) – bardzo rzadko. 8. Posocznica spowodowana zakażeniem bakteryjnym składnika. 9. Poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa (PTP). 10. Poprzetoczeniowa choroba przeszczep przeciwko biorcy (TA-GvHD). 11. Ostra poprzetoczeniowa niewydolność oddechowa (TRALI). 12. Przeniesienie zakażenia innymi czynnikami zakaźnymi, które nie są badane lub rozpoznane.
<u>Dodatkowo w przypadku płodu występuje następujące zagrożenie</u> 1. Przeniesienie wirusa cytomegalii 2. Zatrucie cytrynianem 3. Przeciążenie krążenia